


كيف تعمل معادلة شرودينجر؟



كيف تعمل معادلة شرودينجر؟



www.nasainarabic.net

@NasalnArabic NasalnArabic NasalnArabic NasalnArabic NasalnArabic



في المقالة السابقة قدمنا معادلة شرودينجر (Schrödinger's equation) وحلها، والتابع الموجي الذي يحتوي كل المعلومات التي يجب معرفتها حول نظام كمومي ما. والآن، حان الوقت لرؤية المعادلة أثناء عملها عبر استخدام نظام فيزيائي بسيط جداً كمثال. سننظر أيضاً إلى ظاهرة غريبة أخرى تُعرف بالنفق الكمومي (quantum tunneling).

افتراض أن لديك جسماً يتحرك في بعد واحد فقط إلى الأمام والخلف بين جداري صندوق، أي على طول محور السينات وبين جدارين غير قابلين للاختراق وموجودين عند $x=0$ و $x=L$ ، ولا وجود لقوة تؤثر على الجسم داخل الصندوق، ولذلك، فإن طاقته الكامنة صفر، أي $V(x,t)=0$ حين يكون $0 < x < L$ ، وتوجد قوى كبيرة بشكلٍ لانهائي تدفع الجسم إلى الوراء عندما يصدم الجدران، وبالتالي، فإن الطاقة الكامنة $V(x,t)$ تكون لا نهائية عندما يكون $x \leq 0$ و $x \geq L$ وأصغر $0 < x < L$.

طالما أن الطاقة الكامنة لا تعتمد في هذا المثال على الزمن، فيمكننا استخدام معادلة شرودينجر أحادية البعد والمستقلة عن الزمن داخل الصندوق، وحين نتذكر أن $(V=0)$ داخل الصندوق، يكون لدينا:

$$\left(\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{8\pi^2 mE\psi}{h^2} = 0\right)$$

حيث m هي كتلة الجسيم، و E هي طاقته الكلية، و $(h=6.626068 \times 10^{-34} \text{m}^2\text{Kg/s})$ هو ثابت بلانك. حل المعادلة (1) هو $(\psi(x))$ الذي يُحقق المعادلة عند اشتقاقه، وسيأخذ أي حل للمعادلة (1) الشكل التالي:

$$\psi(x) = A \cos\left(\sqrt{\frac{8\pi^2 mE}{h^2}}x\right) + B \sin\left(\sqrt{\frac{8\pi^2 mE}{h^2}}x\right)$$

حيث A و B ثابتان.

الآن نعرف أن $(\psi(x))$ ترتبط باحتمالية إيجاد الجسيم عند الموقع x واللحظة الزمنية t ، ونعرف أنه لا يمكن للجسيم أن يكون خارج الصندوق، أي في المنطقة $(x < 0)$ و $(x > L)$ لأنه سيحتاج إلى كمية لانهاية من الطاقة للوصول إلى هناك.

يعني ذلك أن $(\psi=0)$ عندما $(x < 0)$ و $(x > L)$ ، ونظراً لأن (ψ) مستمر عند حدود الصندوق، نستنتج أن (ψ) مساوٍ للصفر عند (ψ) ويعني الشرط الأول $(x=0)$ عند $(x=L)$ أن:

$$(A \cos 0 + B \sin 0 = A = 0)$$

وهنا يمكننا إهمال حد دالة جيب التمام (cosine) في المعادلة (2) وتُصبح معادلتنا على الشكل التالي:

$$\psi(x) = B \sin\left(\sqrt{\frac{8\pi^2 mE}{h^2}}x\right)$$

في حين يؤدي الشرط الثاني $(\psi=0)$ عند $(x=L)$ إلى:

$$(B \sin\left(\sqrt{\frac{8\pi^2 mE}{h^2}}L\right) = 0)$$

وهنا إما $B=0$ ، أو أن حد (sine) معدوم، تؤدي الحالة الأولى إلى أن (ψ) يعادل الصفر في كل مكان، ومن الواضح أن ذلك مستحيل لأننا نعرف أن الجسيم موجود في مكان ما في الصندوق، وبذلك نستنتج أن:

$$\sin\left(\sqrt{8\pi^2 mE \over h^2}L\right) = 0$$

الآن نعرف أن $y=0$ فقط عندما يكون y مضروب لـ (π) ، ولذلك:

$$\dots, \sqrt{8\pi^2 mE \over h^2}L = 0, \pi, 2\pi, 3\pi \dots$$

أو بتفسير آخر:

$$\sqrt{8\pi^2 mE \over h^2}L = n\pi$$

علماً أن n عدد صحيح موجب.
تُخبرنا هذه النتيجة أن طاقة الجسيم يُمكن أن تأخذ قيمة منفصلة فقط، أي:


$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$$

من أجل $(n=0, 1, 2, 3, \dots)$

حيث يُعرف الرقم n في مستوى الطاقة (E_n) بالعدد الكمومي لـ (E_n)
يُشير العدد الكمومي $(n=0)$ إلى الطاقة الصفرية (**zero energy**)، لكنه يُعطينا أيضاً التابع الموجي (ψ_0) المعدوم في أي مكان آخر من الصندوق، مما يعني أنه ليس باستطاعة الجسيم أن يكون في أي مكان في الصندوق، وبالتالي، يُستبعد العدد الكمومي $(n=0)$ ، وتُصبح مستويات الطاقة المسموحة (**permissible energy levels**) هي:

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$$

بحيث $(n=0, 1, 2, 3, \dots)$



ازدواجية موجة-جسيم (Wave-particle duality) هي مفهوم محوري في ميكانيكا الكم.

إن الحقيقة التي تقول بأن طيف الطاقة منفصل، أي أنه ليس باستطاعة الطاقة أن تأخذ كل القيم وخصوصاً كون الطاقة الصفرية غير مسموحة، هي نتائج لن نحصل عليها في الميكانيكا التقليدية، وفي الحقيقة تتحدى هذه النتائج الحكمة التقليدية التي تقول بأن كميات مثل الطاقة يجب أن تتغير بشكل مستمر، فوفقاً لغوتفريد لايبنتز **Gottfried Leibniz** فإن "الطبيعة لا تصنع القفزات".

تُخبرنا الفيزياء الكلاسيكية أيضاً أن الحالة الطاقية الأدنى لنظام ما، أو ما يُعرف أيضاً بالحالة الأرضية أو الفراغ، يجب أن تكون طاقتها منعدمة. لكنّ هذه النتائج الكمومية الغريبة تتفق مع عمليات الرصد التجريبية للأنظمة الكمومية كما هو الحال على سبيل المثال مع طيف الطاقة المنفصل لذرة الهيدروجين.

يُمكن إيجاد قيمة الثابت **B** عبر استنظام (normalising) الدالة الموجية، تذكر أن:

$$\int |\Psi(x)|^2 dx = \int |\psi(x)|^2 e^{-\{(2\pi i E/h)t\}} dx = \int |\psi(x)|^2 e^{-\{(2\pi i E/h)t\}} dx$$

الآن لدينا $\psi(x) e^{-\{(2\pi i E/h)t\}}$ عبارة عن عدد مركب، ويُمكن كتابته بالشكل التالي أيضاً:

$$\psi(x) = e^{-i(2\pi/\hbar)Et} = \cos(-2\pi/\hbar Et) + i \sin(-2\pi/\hbar Et)$$

وتمثيل العدد المركب $e^{-i(2\pi/\hbar)Et}$:

$$\cos^2 + \sin^2 = \cos(-2\pi/\hbar Et) + \sin^2(-2\pi/\hbar Et) = 1$$

معتمدين بذلك على معادلة مثلثية، وبالتالي يُصبح لدينا:

$$|\Psi(x)|^2 = \Psi(x)^* \Psi(x) = e^{i(2\pi/\hbar)Et} e^{-i(2\pi/\hbar)Et} |\Psi(x)|^2 = |\Psi(x)|^2$$

ويعرف أن $|\Psi(x)|^2$ هو دالة الكثافة الاحتمالية لإيجاد الجسيم في الموقع x واللحظة الزمنية t ، وبتفسير آخر، فإن احتمالية إيجاد الجسيم في مكان ما في الصندوق تُعطى بالعلاقة:

$$\int_0^L |\Psi(x)|^2 dx = \int_0^L |\Psi(x)|^2 dx$$

وطالما أننا نعرف أن الجسيم موجود بشكلٍ حتمي في مكان ما في الصندوق، فإنه يصبح لدينا:

$$\int_0^L |\Psi(x)|^2 dx = \int_0^L |\Psi(x)|^2 dx = 1$$

وبتعويض التعبير الخاص بـ $\Psi(x)$ من المعادلة (3)، نحصل على:

$$\int_0^L B^2 \sin^2 \left(\sqrt{8\pi^2 mE} x \right) dx = 1$$

ويعرف أن:

$$\int \sin^2(ax) dx = \frac{1}{2a} \sin(ax) \cos(ax) + \frac{x}{2}$$

يُمكننا استنتاج أن:

$$B = \sqrt{2/L}$$


$$E_{n+1} - E_n = \frac{(n+1)^2 h^2}{8mL^2} - \frac{n^2 h^2}{8mL^2} = \frac{h^2((n+1)^2 - n^2)}{8mL^2} = \frac{h^2(2n+1)}{8mL^2}$$

كلما كانت كتلة الصندوق وطوله أكبر، كلما اقترب هذا الفرق من الصفر، ولذلك، فإن السويات الطاقية المسموحة بالنسبة للأجسام الكبيرة قريبة جداً من بعضها بحيث يُصبح من المستحيل التمييز بينها وبين تلك السويات غير المسموحة، وبذلك، تظهر السوية الطاقية متغيرةً بشكل مستمر.

النفق الكمومي

الآن لنُغير إعداداتنا قليلاً، ولنستمر في الافتراض أن جسيمنا يتحرك على طول المحور x ، لكن، لنفترض الآن أن الطاقة الكامنة معدومة في المجال $(-\infty < x \leq 0)$ وفي $(L \leq x < +\infty)$ ، وغير مساوية للصفر بين 0 و L ، إذاً $(V = V_0 \neq 0)$ و $(x < L > 0)$

يُعرف ذلك بالحاجز الكُمونيّ (**potential barrier**)، وتُخبرنا الفيزياء الكلاسيكية أنه إذا تحرك الجسيم إلى اليمين على طول الجزء السالب من المحور x ونحو الصفر، فيُمكنه اختراق المنطقة بين 0 و L فقط إن كانت طاقته E أكبر من (V_0)



النفق الكمومي: يُوضح المحور العامودي الطاقة الكامنة للجسيم. والذي يساوي V_0 لكل x أكبر من الصفر وأصغر من L ، ويساوي صفر في أي مكان آخر.

يُشابه الأمر قليلاً كرةً بكتلة m تتدحرج وتواجه تلة بارتفاع H ، فإذا كان لدى الكرة كمية كافية من الطاقة للتحرك إلى قمة التل، فستكون طاقتها الكامنة هناك $(V_0 = mgH)$ ، حيث g هو ثابت تسارع الجاذبية الأرضية، وإذا كانت طاقتها أقل من (V_0) ، فلن تتمكن الكرة

وتمتلك التلة في تجربتنا منحدرًا عامودياً لأن الطاقة الكامنة تقفز بشكلٍ منقطع بين القيمتين 0 و (V_0) عند $x=0$ و $x=L$ ، وهي مسطحة على القمة لأن الطاقة الكامنة ثابتة في المجال $(0 < x < L)$.

تبين أنه بإمكان الجسم في ميكانيكا الكم التسلق إلى القمة، وحتى الوصول إلى الجانب الآخر من "تلة الكمون" حتى لو كانت طاقته أقل من (V_0) ، لن نغوص في التفاصيل هنا، لكن يُقدم حل معادل شرودينجر (بمعرفته $(\nabla^2 < V_0)$) يعني ذلك أن الجسم القادم من اليسار لن تكون احتمالية مشاهدته في الجانب الأيمن من الحاجز أو داخله مساوية للصفر، فهناك احتمالية صغيرة، لكن غير مساوية للصفر، لكي نجد أن الجسم اخترق الحاجز ووصل إلى الجانب الآخر، على الرغم من أنه لا يستطيع ذلك عند استخدام الفيزياء الكلاسيكية لأنه لا يملك الطاقة اللازمة، وكما توقعت، تصبح هذه الاحتمالية أصغر كلما أصبح الحاجز أسمك، أي كلما أصبحت قيمة L أكبر.

بشكلٍ عام، يُشير مصطلح النفق الكمومي (**quantum tunneling**) إلى أي حالة يُمكن فيها للجسم التغلب على حاجز كمون لا يُمكنه التغلب عليه وفقاً للفيزياء الكلاسيكية. تحصل ظاهرة النفق الكمومي في الطبيعة، إذ يُمكننا مشاهدتها على سبيل المثال عندما يتفكك اليورانيوم إلى ثوريوم بواسطة تفكك إشعاعي يُعرف بتفكك ألفا (**alpha decay**)، وفي هذا التفكك، تُصدر النوى الذرية جسيم ألفا (**alpha particle**)، الذي يتألف من بروتونين ونيوترونين وهو مطابق تماماً لنواة الهيليوم.

وفقاً للفيزياء الكلاسيكية، يجب أن تكون عملية إصدار الجسم مستحيلة لأنها تتطلب طاقة أكبر مما هو بحوزة الذرة، لكن، تتيح ظاهرة النفق الكمومي حدوث هذه العملية.

والسؤال الكبير الذي تقودنا إليه كل هذه العمليات الرياضية هو: ماذا تُخبرنا معادلة شرودينجر عن الواقع الفيزيائي (**physical reality**)، وكيف يجب أن نُفسر حلها "التابع الموجي"؟

هذا ما سنستكشفه في مقالة ثالثة.

• التاريخ: 2015-08-31

• التصنيف: أسئلة كبرى

#ميكانيكا الكم #النفق الكمومي #معادلة شرودينجر



المصطلحات

• **النفق الكمومي (quantum tunneling)**: يُشير هذا المصطلح إلى ظاهرة كمومية يُمكن من خلالها للجسيمات عبور حاجز لا يُمكنها عبوره في الفيزياء الكلاسيكية.

المصادر

• plus

المساهمون

- ترجمة
 - همام بيطار
- مراجعة
 - فراس الصفدي
- تحرير
 - نداء الباطين
 - محمد وليد قبيسي
- تصميم
 - أنس شحادة
- نشر
 - مي الشاهد