


ما يمكن رؤيته في سماء شهر شباط/فبراير؟



ما يمكن رؤيته في سماء شهر شباط/فبراير؟



www.nasainarabic.net

@NasalnArabic f NasalnArabic NasalnArabic NasalnArabic NasalnArabic



سينضم الهلال في أول شباط/فبراير مع الزهرة و المريخ و أورانوس ليظهروا معا في الجهة الجنوبية الغربية من السماء مباشرة بعد غروب الشمس. إذا كنت تراقب كوكب الزهرة على مدار عدة شهور، فلا بد أنك لاحظت أن كوكب الزهرة أكثر الأجرام لمعانا (بعد القمر بالطبع). وإذا كنت تبحث عن المتعة الحقيقية يمكنك مراقبته عبر التلسكوب؛ فبينما يضيء كوكب الزهرة، سيتقلص حجم الهلال، وسيزداد قطره الظاهري. و سيبقى كوكب الزهرة بنفس درجة اللمعان طوال الشهر.

يأتي المريخ مباشرة فوق الزهرة، و يظهر معه كوكب أورانوس هذا الشهر. يبدو المريخ أكثر لمعانا من أورانوس بشكل جلي، لكن ما يزال بإمكانك رؤيتهما عبر منظار، رغم أن التلسكوب يظهر مزيدا من التفاصيل.

نتج الشهب عند احتراق جسيمات من غبار المذنبات والكويكبات في الغلاف الجوي لكوكب الأرض؛ وفي حين لن يكون شهر شباط/فبراير شهراً مثالياً لزخات الشهب، قد تشاهد نوعاً مختلفاً من جسيمات الغبار تدعى بالأضواء الفلكية (أو أضواء دائرة البروج أو النظام الشمسي) **Zodiacal Light**.

و هذه الأضواء الفلكية عبارة عن توهج ثلاثي ينتج عندما تنعكس أشعة الشمس عن ذرات الغبار في مستوى نظامنا الشمسي. ويمكنك اتخاذ المريخ والزهرة علامتي إرشاد لتحديد التوهج مخروطي الشكل في الأفق الغربي عند غروب الشمس في أواخر شهري شباط/فبراير وأذار/مارس.

بدا المذنب **45p** ظاهراً للعيان بعد غروب الشمس خلال الشهرين الماضيين، وسيكون في أقرب نقطة له من الأرض في 11 شباط/فبراير عندما سيصل إلى بعد 0.08 وحدة فلكية (أي ما يعادل 7,4 مليون ميل) عن الأرض. وسيكون ظاهراً صباحاً في كوكبة هرقل **constellation Hercules**. ومن ثم سيمر المذنب في كل من كوكبة الإكليل الشمالي (**Corona Borealis**)، و كوكبة الراعي (**Boötes/the Herdsman**) وكوكبة كلاب الصيد (**Canes Venatici/Boötes' hunting dogs**) و كوكبة الدب الأكبر (**Ursa Major**).

ومن ثم يتابع إلى كوكبة الأسد **Leo** مع نهاية شهر شباط/فبراير. و يتحرك هذا المذنب بسرعة 9 درجات كل يوم، و سيعود مرة أخرى عام 2022. أما القسم الثاني من المذنبات المرئية لهذا العام عبر المناظير أو التلسكوبات سيكون المذنب **2P Encke**. حيث يعود إلى مرآنا بعد دورة لمدة 3.3 عام حول الشمس. وبالإمكان العثور عليه في كوكبة الحوت؛ ويمكن رؤيته عبر المناظير طيلة أيام هذا الشهر.

وأخيراً، سيكون فيستا **Vesta** وهو أكثر الكويكبات لمعانا، واضحا وسهل الرؤية بالقرب من نجوم كاستور **Castor** و بولكس **Pollux** في كوكبة الجوزاء.

يمكنكم متابعة جميع مهمات ناسا على [/https://www.nasa.gov](https://www.nasa.gov)

• التاريخ: 2017-02-04

• التصنيف: علوم أخرى

#النظام الشمسي #أهم الأحداث الفلكية #دائرة البروج #ارصاد الاجسام القريبة من الارض



المصطلحات

- الكوكبة (**Constellation**): أو البرج (أحياناً)، وفي علم الفلك الحديث، تُشير هذه الكلمة إلى منطقة محددة من السماء داخل الكرة السماوية التي عرّفها وحددها الاتحاد العالمي لعلم الفلك (IAU).

المصادر

- ناسا

المساهمون

- ترجمة
 - بشرى أبو عرة
- مراجعة
 - علي الخطيب
- تحرير
 - أنس الهود
- تصميم
 - Tareq Halaby
- نشر
 - مي الشاهد