


تحويل الذاكرة - الجزء الثاني



سلسلة

علوم وطب الأعصاب

تحويل الذاكرة - الجزء الثاني



www.nasainarabic.net

@NasalnArabic

NasalnArabic

NasalnArabic

NasalnArabic

NasalnArabic



تفاعل اللوزة مع الأنظمة الدماغية الأخرى في تحويل الذاكرة

تم الحصول على نتائج متقاربة لآثار تحويل الذاكرة في معالجات اللوزة التالية للتدريب، وذلك في تجارب تستخدم أنواعاً شتى من التدريبات. وكذلك بما أنه من المعروف أن تجارب التدريب المختلفة تقوم بإشغال مناطق مختلفة من الدماغ، فإن التحويل الذي تحفزه BLA يشتمل على تأثيرات تتعلق بالمعالجة التي تحدث في هذه المناطق من الدماغ.

هناك أدلة معتمدة تنبؤنا أن النواة الذنبية والحصين لهما علاقة بأنواع مختلفة من التدريب. في الجرذان التي خضعت لتدريب متاهة الماء


water-maze training، نجد أن الأمفيتامين الذي حُقن في النواة الذنبية بعد التدريب قد حسّن من التدريب المعتمد على الأدلة البصرية بشكل انتقائي، ولكن حقن الأمفيتامين في الحصين الظهراني **dorsal hippocampus** قد حسّن من الذاكرة المتعلقة بالتدريب المكاني **spatial training** بشكل انتقائي. وعلى العكس من ذلك، فإن الأمفيتامين المحقون في اللوزة بعد التدريب يحسن من الذاكرة المتعلقة بنوعي التدريب أنفي الذكر. من الجدير بالذكر أن تعطيل اللوزة قبل اختبار تثبيت الذاكرة لم يعطل الذاكرة المتعلقة بأي من نوعي التدريب أنفي الذكر. وبالتالي يمكن القول أن اللوزة ليست موضعاً للذاكرة المحسنة لأي من نوعي التدريب المذكورين.

كذلك، فإن التحفيز النورأدريني للوزة الوحشية القاعدية (**BLA**)، والتي تحسن من توطيد الذاكرة، يؤدي إلى زيادة مستويات بروتين الهيكل الخلوي الخاضع للنشاط (**Arc protein**) في الحصين الظهراني، وهو أحد الجينات الفورية المبكرة **Immediate early gene** والذي له علاقة في اللدونة [1] **plasticity** التشابكية في الحصين، وبعمليات توطيد الذاكرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعطيل الـ **BLA** يعطل توطيد الذاكرة ويقلل من مستويات بروتين **Arc** في الحصين الظهراني. وأيضاً، فإن عمليات حقن الميوسيمول [2] **muscimol** داخل الـ **BLA** يضعف من زيادة **mRNA** الخاص بـ **Arc**، والذي يتم تحفيزه في العادة في الإشارات السياقي للخوف **contextual fear conditioning**، وهي مهمة معروفة بأنها تشتمل على اللوزة.

تقوم صدمة قدمية [3] واحدة من النوع الذي يُستخدم في هذا النوع من التدريبات بإحداث زيادة ثابتة في معدل القرح **firing rate** في الخلايا الموجودة في الـ **BLA**، والذي يمكن أن يساهم في تحويل عملية معالجة الذاكرة في المناطق التي ترد إليها الأعصاب من الـ **BLA**، وهي تشمل الحصين ومناطق أخرى. يقوم التدريب الذي يشتمل على اللوزة بتحفيز عملية التعبير **expression** للعديد من الجينات التي تنظمها عملية النسخ، والتي لها علاقة باللدونة التشابكية في العديد من مناطق الدماغ، وذلك يتضمن الحصين والنواة الذنبية والقشرة، وكذلك اللوزة.

تقوم عمليات حقن العقارات التالية للتدريب في مختلف المناطق في قشرة المخ بتحويل عملية توطيد الذاكرة، وذلك لعدة أنواع من التدريب، وكذلك فإن الآفات الحاصلة في **BLA** تمنع عملية تحسين الذاكرة والتي يحفزها حقن **8-bromo-cAMP** في القشرة الشمية الداخلية **entorhinal cortex** بعد التدريب. كما تقوم عملية حصر مستقبلات الأدرينية البيتاوية في **BLA** بمنع الآثار المحسنة للذاكرة للأدوية المحقونة في القشرة الجزيرية **insular cortex** والقشرة الحزامية الأمامية. وكذلك تتفاعل الـ **BLA** بشكل مباشر مع القشرة أمام الجبهية الإنسانية في تحويل عملية توطيد الذاكرة.

تؤثر الـ **BLA** كذلك في وظيفة القشرة المتعلقة بالذاكرة، وذلك عن طريق الأعصاب الصادرة منها إلى النواة القاعدية، والتي تزود القشرة بالتنشيط الكوليني. كما أن الآفات التي تصيب الأعصاب الكوليني الصادرة من النواة القاعدية باتجاه القشرة تقوم بحجب الآثار المحورة للذاكرة والناجمة عن عمليات حقن النورإبينفرين داخل الـ **BLA** والتالية للتدريب.



Rooyendaal and McGaugh
Figure 2

الشكل 2: يلخص عملية التفاعل بين الـ BLA والأنظمة الأخرى في تنظيم عملية توطيد الذاكرة

تعتبر الأعصاب الصادرة عن النواة القاعدية نحو القشرة مهمة في لدونة القشرة المحفزة بالتعلم. ينشط تحفيز الـ BLA القشرة المخية، وهو ما يشير إليه إزالة التزامن في مخطط كهربية الدماغ، كما يقوم تحفيز الـ BLA بتمكين تأثيرات النواة القاعدية في تنشيط القشرة. علاوة على ذلك، يقوم تعطيل النواة القاعدية بحجب آثار الـ BLA على تنشيط القشرة.

نشاط اللوزة وتحوير عملية توطيد ذاكرة الإنسان

النتائج التي حصلنا عليها من العديد من الدراسات على البشر حول آثار الاستثارة العاطفية، وهرمونات الكرب **stress hormones** وتنشيط اللوزة، هي نتائج متوافقة مع تلك التي حصلنا عليها من الدراسات على الحيوانات؛ فمثلاً يقوم الكورتيزول الذي يعطى للأفراد قبل عرض كلمات أو صور عليهم بتحسين نسبة الاسترجاع لها فيما بعد. كما يقوم الأمفيتامين المعطى لعناصر الدراسة من البشر، سواء قبل تعلمهم لقائمة من الكلمات أو بعد ذلك، بتحسين الذاكرة طويلة الأمد. كذلك فإن إعطاء البروبرانولول لعناصر الدراسة قبل رؤيتهم لشرائح

عرض مثيرة للعواطف يقوم بحجب آثار الاستثارة العاطفية والكرب على الذاكرة (وهي آثار محسنة للذاكرة). علاوة على ذلك، فإن الإبينفرين، أو اختبار البرد الراجع للضغط [4] **cold pressor stress** (والذي يحفز إفراز هرمونات الكرب الكظرية)، والذي يعطى للأشخاص قبل أن يروا صوراً مثيرة للعواطف، يحسن من ذاكرة هؤلاء الأشخاص.

لتنشيط اللوزة علاقة بالذاكرة المحسنة بسبب الاستثارة العاطفية. عند الأفراد المصابين بأفة في اللوزة في جانبي الدماغ، لا يتم تحسين الذاكرة الخاصة بالذكريات المثيرة للعاطفة. تعطينا الدراسات المستخدمة لتصوير الدماغ أدلة إضافية على أن أثر الاستثارة العاطفية على ذاكرة الدماغ هو أمر يشتمل على تنشيط اللوزة. نشاط اللوزة، والذي تم تقييمه باستخدام التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني PET خلال مشاهدتهم لأفلام مستثيرة للعاطفة، يرتبط بشكل كبير بتذكر عناصر الدراسة للأفلام، وذلك في اختبار ذاكرة مفاجئ بعد ثلاثة أسابيع. يظهر أن درجة الاستثارة العاطفية، وليس التكافؤ العاطفي [5] **valence**، هو العنصر الحاسم في التأثير على الذاكرة. حصلت الدراسات التي تستخدم التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي (fMRI) على نتائج مقارنة جداً. من الجدير بالذكر، أن مناهضات المستقبل الأدرينية البيتاوية (كالبروبرانولول) تمنع الزيادة في نشاط اللوزة، وفي الاحتفاظ المحسن بالذكريات، واللذين تحفزهما المنبهات العاطفية التي جرى التقاطها في الدراسات المستخدمة للتصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي.

كما تزودنا نتائج أخرى حصلنا عليها من تحليل مسوحات PET، و fMRI دليل على أن تنشيط اللوزة يحفز معالجة الذاكرة في مناطق أخرى في الدماغ، الأمر الذي يتوافق مع نتائج الدراسات على الحيوانات. يتم تحفيز اللوزة والمناطق الحصينية/المجاورة للحصين خلال الاستثارة العاطفية، ويتوافق هذا التنشيط مع تثبيت الذاكرة الذي يتلو ذلك. هذا وتقدم النتائج المستقاة من دراسة "تحليل السبل"، والتي درست نشاط اللوزة بينما كانت شرائح ذات مضمون عاطفي تعرض على عناصر الدراسة، أن الاستثارة العاطفية تزيد من الآثار التي تؤثر بها اللوزة على نشاط التلغيف المجاور للحصين بنفس الجانب من الدماغ، وكذلك القشرة أمام الجبهية البطنية الوحشية **ventrolateral prefrontal cortex**.

علاقة اللوزة بتحويل استعادة الذكريات والذاكرة العاملة

تؤثر الأنظمة المعدلة العصبية على استعادة الذكريات والذاكرة العاملة، وكذلك تلعب الـ **BLA** دوراً تحويلياً هاماً في التحكم بهذه الآثار على هذه الوظائف للذاكرة، وذلك عبر الأعصاب الصادرة عنها إلى مناطق أخرى من الدماغ.

استعادة الذكريات: يضعف كل من التعرض للضغط النفسي أو التعرض لأثر القشرانيات السكرية، والتي تُعطى حقناً في الدم قبل وقت قصير من اختبار الاحتفاظ بالذكريات، عملية استعادة الذكريات. بشكل مماثل، وكما شرحنا عن توطيد الذاكرة، فإن آثار القشرانيات السكرية على استعادة الذكريات تعتمد على التنشيط المتزامن للميكانيكيات النورأدرينية. كما أن مناهض المستقبل الأدرينية البيتاوية، والذي يعطى حقناً في الدم قبل اختبار الاحتفاظ بالذكريات، يقوم بحجب إضعاف عملية استعادة الذكريات، والتي يحفزها الحقن المتزامن للقشرانيات السكرية. يقوم الحقن الطرفي (في الأوعية الطرفية) لمناهض الأفيون الببتيدي النالوكسون (**naloxone**) أو مناهض مستقبل الدوبامين **D2** بحجب الأثر المضعف للقشري السكري المحقون بشكل متزامن على استعادة الذكريات.

وكذلك فإن ناهض مستقبل القشرانيات السكرية المعطى في منطقة الحصين قبل وقت قصير من اختبار استعادة الذكريات يضعف استعادة الذكريات. ومما يوافق هذه النتائج المتعلقة بتجارب الأدوية المحقونة طرفياً، أن مناهض مستقبل الأدرينية البيتاوية والمحقون في الحصين يمنع الأثر المضعف لاستعادة الذكريات، والذي تقوم به ناهضات مستقبل القشرانيات السكرية، والتي يتم حقنها بشكل متزامن. ويقوم النورإبينفرين المحقون في **BLA** بإضعاف استعادة الذكريات. علاوة على ذلك، فإن الـ **BLA** معروفة بتفاعلها مع الحصين في التوسط في تحقيق آثار القشرانيات السكرية على استعادة الذاكرة. كذلك فإن الآفات الحاصلة في الـ **BLA**، أو حقن مناهضات المستقبل الأدرينية البيتاوية في الـ **BLA** يحجب الأثر المضعف لعملية استعادة الذاكرة، والذي يمارسه ناهض مستقبل

تتوافق نتائج الدراسات التي تفحص آثار هرمون الكرب على استعادة الذاكرة في البشر، مع النتائج التي حصلنا عليها من التجارب على الحيوانات، كما أنها تشير إلى أن القشرانيات السكرية تقوم بإضعاف عملية استعادة الذاكرة عن طريق التفاعل مع الميكانيكيات النورأدرينية. يقوم مستوى الكورتيزول عند الكرب، أو الكورتيزون الذي يعطى لعناصر الدراسة من البشر بإضعاف الاستعادة الآجلة، وليس الفورية، للمهام المعتمدة على الأحداث، ويقوم مناهض المستقبلية الأدرينية البيتاوية (البروبرانولول) بحجب هذا الإضعاف لاستعادة الذاكرة. تشير النتائج الحديثة من دراسة **H2150-PET** إلى أن آثار القشرانيات السكرية على استعادة الذاكرة في العناصر البشرية يتم عن طريق التواسط، ولو بشكل جزئي، من قبل الأنشطة الحاصلة في الحصين. كما تشير نتائج أخرى لدراسات تصويرية أجريت على البشر إلى أن اللوزة والحصين يتفاعلان خلال استعادة المعلومات المثيرة للعواطف.

الذاكرة العاملة: يؤثر التعرض للكرب (**stress**) سلباً على الذاكرة العاملة المعتمدة على القشرية أمام الجبهية الإنسية، فيقوم بإضعافها، والذاكرة العاملة هذه هي عملية ديناميكية يتم فيها تحديث المعلومات بشكل مستمر. وكذلك، وكما يحدث في الكرب، فإن إعطاء القشرانيات السكرية يضعف الذاكرة العاملة عند الجرذان والبشر على حد سواء. تقوم القشرانيات السكرية بالتفاعل مع الميكانيكيات النورأدرينية في القشرة أمام الجبهية الإنسية، محفزةً إضعاف الذاكرة العاملة. كما يجب إعطاء مناهض المستقبلية الأدرينية البيتاوية، سواء أكان ذلك حقناً في الدم أو في القشرة أمام الجبهية الإنسية، آثاراً القشرانيات السكرية على الذاكرة العاملة. وفوق ذلك، فإن القشرانيات السكرية تزيد من إفراز النورإبينفرين في القشرة أمام الجبهية الإنسية. كما تُضعف المستويات الزائدة من النورإبينفرين في القشرة أمام الجبهية الإنسية الذاكرة العاملة، ويتواسط تنشيط كل من المستقبلية الأدرينية البيتاوية والمستقبلية الأدرينية من نوع ألفا 1 في تحقيق آثار النورإبينفرين. وبخلاف ذلك، فإن تنشيط المستقبلية الأدرينية ألفا 2 يحين من الذاكرة العاملة. وكذلك تؤثر ناهضة المستقبلية الدوبامينية **D1** على أداء الذاكرة العاملة، وذلك بعد تحقيق علاقة بين الجرعة والاستجابة ذات منحنى يشبه حرف **U** مقلوباً؛ حيث يظهر أن التحفيز الكثير جداً أو القليل جداً لمستقبلات **D1** يضعف الذاكرة العاملة في الفئران والجرذان والقرود.

كما يعتمد إضعاف الذاكرة العاملة، والذي تحفزه القشريات السكرية، على التفاعلات بين القشرة أمام الجبهية الإنسية والـ **BLA**. لا يظهر أن الـ **BLA** نفسها تلعب دوراً مهماً في الذاكرة العاملة، ولكن الآفات الحاصلة في الـ **BLA** تحجب الإضعاف الذي يحفزه إما حقن الكورتيكوستيرون في الدم، أو حقن ناهضات مستقبلية القشريات السكرية في القشرة أمام الجبهية الإنسية.

ملخص

تزودنا الأدلة التي راجعناها في الأعلى بأدلة كثيرة على أن تنشيط الأنظمة المعدلة العصبية، والذي تحفزه الاستثارة العاطفية، يقوم بتحويل توطين الذاكرة، واستعادة الذاكرة، والذاكرة العاملة، وذلك عبر التنشيط النورأدريني للـ **BLA** والأعصاب الصادرة عنها لمناطق أخرى من الدماغ مسؤولة عن معالجة الذاكرة.

• التاريخ: 2017-10-02

• التصنيف: علوم الأعصاب

#الدونة #النواة الذنبية #هرمونات الكرب #الجبهة البطنية الوحشية



المصطلحات

• **Doping (التنشيط):** هي عملية إدخال مواد إضافية - غالباً ما تكون شوائب (impurities) - في معدن لتغيير خصائص التوصيل لديه. فيمكن أن تكون الموصلات فائقة التوصيل المُطعمّة (Doped superconductors) أكثر كفاءة من نظرائها النقية. فبعض تجاوير المسرّع مصنوعة من النيوبيوم (niobium) المُطعمّ بذرات النيتروجين. ويُدرس ذلك لاستخدامه في تصميم المغناط فائقة التوصيل كذلك.

المصادر

• SCHOLARPEDIA

• الصورة

• الصورة

المساهمون

• ترجمة

◦ عبد الرحمن سوالمه

• مُراجعة

◦ أحمد قرابصة

• تحرير

◦ سارية سنجقदार

◦ عمر الكردي

• تصميم

◦ هادي أبو حسون

◦ رنيم ديب

• نشر

◦ بيان فيصل