

التبدلات الغامضة في الـ DNA أثناء الاستجابة للشدة



علم وطب الأعصاب

التبدلات الغامضة في الـ DNA أثناء الاستجابة للشدة



www.nasainarabic.net

@NasalnArabic NasalnArabic NasalnArabic NasalnArabic NasalnArabic



يدرس علماء الوراثة في إيموري مثلثة الأساس A للـ DNA (أدينين Adenine)، الذي يبدو أكثر توافراً في أدمغة الفئران تحت ظروف الشدة، ومن الممكن أن له دوراً في الاضطرابات العصبية النفسية.

مع تقدم علوم الوراثة، يكتشف العلماء مكونات إضافية تدخل في تركيب الحمض النووي عند الحيوانات. لكن هل لهذه التغيرات الكيميائية غير الاعتيادية للـ DNA معنى خاص؟ أم إنها مجرد علامات تشير إلى ارتكاب الآليات الخلوية الأخطاء؟

درس علماء الوراثة في مدرسة الطب بجامعة إيموري ويقودهم الدكتور بينغ جين Peng Jin تغييراً غير مفهوم جيداً على دنا الحيوانات وهو مثيلة الأساس A للحمض النووي دنا، وقد وجدوا كثرة توافره في الدماغ تحت ظروف الشدة وبالتالي ربما له دور في الاضطرابات

العصبية النفسية. والنتائج مجدولة للنشر في مجلة **Nature Communications**.

عموماً تكبح مثيلة الأساس **C** للدنا (سيتوزين **Cytosine**) تعبير المورثات وهذا جزء هام من التنظيم فوق الجيني الذي هو طريقة تغير بها الخلايا طريقة تعبيرها عن شيفرة الدنا دون تغيير أسس الدنا بحد ذاتها.

يصف مصطلح المثيلة إضافة وسمة تتألف من ذرة كربون واحدة وثلاث ذرات هيدروجين (**-CH3**).


لكن ماذا لو ظهرت المثيلة على الأدينين؟ بالنسبة للبكتيريا فإن مركب **N-6-ميثيل أدينين (N-6-methyl-adenine)** هو جزء من دفاع البكتيريا عن نفسها ضد غزو العاثيات (فيروسات تصيب البكتيريا)، ولكن حديثاً وُصف وجود هذا المركب ذاته في دنا الحشرات والندبيات، إلا أن وظيفة هذا التغير فوق الجيني لم تُفسر بالكامل حينها.

كبدائية، فإن وجود زمرة **-CH3** الإضافية هذه بارزة من الدنا قد يقف عائقاً في طريق البروتينات التي ترتبط بالدنا والفعالية المورثية المباشرة أيضاً. بالنسبة لمثيلة **C** (سيتوزين) فإن العلماء يعرفون الكثير عن الأنزيمات التي تحمله، وتضيفه، وتزيله، أما بالنسبة لمثيلة **A** فلا تزال معرفتنا قاصرة عنها.

يقول جين: "لقد وجدنا أن **6-ميثيل-أدينين** نشط حركياً، ما قد يقترح أنه ذو دور وظيفي، وعلى الرغم من ذلك فإن الأنزيمات التي تتعرف على هذا النوع من مثيلة الدنا أو تضيفه أو تزيله لا تزال غامضة. يبدو أن الأنزيمات التي تضيف زمر الميثيل للأدينين عندما يكون جزءاً من الرنا **RNA** غير محتسبة".


a

Intergenic sig. gain-of-6mA annotation



b


Intergenic sig. loss-of-6mA annotation



c




d



e

LINE transposon (103/120 total expressed) with sig.6mA alteration upon stress



تزداد مثيلة الأدينين (إضافة زمرة الميثيل) بمقدار أربعة أضعاف

مؤلف الدراسة الرئيس هو الدكتور بينغ ياو **Bing Yao**، بروفيسور مساعد في علوم الوراثة البشرية، قد أنشأ مؤخراً مختبره الخاص في

إيموري لاختبار هذه المستجدات وغيرها المتعلقة بتركيب الدنا. أما جين فهو نائب رئيس مجلس الأبحاث في قسم علوم الوراثة البشرية.

في الورقة العلمية المنشورة في مجلة **Nature Communications**، ألقى كل من ياو وجين وزملاؤهم الضوء على القشرة أمام الجبهية لأدمغة الفئران التي تعرضت للشدة في نماذج معيارية لدراسة الاكتئاب (اختبار السباحة القسرية واختبار تعليق الذيل)، في ظل هذه الظروف، وجد العلماء ارتفاع كمية N-6-ميثيل-أدينين في دنا خلايا الدماغ بمقدار أربعة أضعاف.

كُشف هذا التغير باستخدام تقنيتين حساستين: الاستشراب السائل **Liquid Chromatography**/قياس الطيف الكتلي **Mass Spectrometry** والربط مع ضد مضاد للـ **N-6-ميثيل-أدينين**. بلغت الكمية القصوى من هذا المركب 2.5 جزء بالمليون والتي ليست بذلك الارتفاع الكبير إلا أنها تبدو محصورة بمناطق محددة من الجينوم.

وُجد ميلٌ لمثيلة **A** للظهور أكثر في المناطق بين المورثية بينما غلب غيابه عن أجزاء الجينوم التي تشفر البروتينات.

يرتبط غياب الميثيل **A** مع الجينات التي تتحفز استجابةً للشدة، ما يقترح أن شيئاً ما يزيلها من مناطق المورثات الفعالة. ويضيف جين: "يبدو أن هنالك نوعاً من التداخل بين المثيلة **A** و **C**".

إن تغيرات **6mA** المحدثة على الجينات نتيجة الشدة تتداخل مع تلك التغيرات المترافقة مع الاضطرابات العصبية النفسية، وهذه العلاقة تحتاج إلى المزيد من الاستقصاء.

يتنبأ العلماء أن **6mA** الشاذ كاستجابة للشدة قد يساهم في الأمراض العصبية النفسية عبر الاستخدام غير المناسب للبروتينات الرابطة للدنا.

• التاريخ: 2017-12-06

• التصنيف: علوم الأعصاب

#الحمض النووي #سيتوزين #مركب ميثيل أدنين #القشرة أمام الجبهية #الاستشراب السائل



المصطلحات

- الأيونات أو الشوارد (Ions): الأيون أو الشاردة هو عبارة عن ذرة تم تجريدها من الكتلون أو أكثر، مما يُعطيه شحنة موجبة. وتسمى أيوناً موجباً، وقد تكون ذرة اكتسبت الكتلوناً أو أكثر فتصبح ذات شحنة سالبة وتسمى أيوناً سالباً

المصادر

- الورقة العلمية

• Science Daily

• الصورة

المساهمون

• ترجمة

◦ علي رفعت محمد

• مراجعة

◦ مريانا حيدر

• تحرير

◦ محمد عزيز

◦ ليلاس قزيز

• تصميم

◦ رنيم ديب

• نشر

◦ بيان فيصل