

انحناء الأصابع أو ما يُسمى بتقفع دوبيوتران



انحناء الأصابع أو ما يُسمى بتقفع دوبيوتران



www.nasainarabic.net

@NasalnArabic NasalnArabic NasalnArabic NasalnArabic NasalnArabic



في حالة انكماش دوبيوتران ، يتم سحب إصبع واحد أو أكثر باتجاه راحة اليد. حقوق الصورة: iStock.

يحدثُ هذا التقفع بسبب تراكم الكولاجين تحت سطح الجلد لراحة اليد على شكل حبل، ومع مرور الوقت يمكن أن تُتَّني إصبعاً أو أكثر من أصابعك ثم لا تتمكن من فَردها.

سبب هذا المرض:

السببُ غيرُ معروفٍ، ولكن هُنَاكَ عوامل خطر تُزيدُ من حدوثه تشملُ التاريخَ العائليَّ، الكحوليات، التدخين، مشاكل الغدة الدرقية، أمراض الكبد، داء السكري، إصابة سابقة في اليد، والصرع.

مراحل تقفع دوبيوتران:

1. يتكون الكولاجين في اليد تحت سطح الجلد.
2. يغلظ الكولاجين حتى يكون مثل الحبل، يمتد هذا الحبل من راحة اليد وحتى الإصبع.
3. يؤدي قصر طول الحبل إلى انثناء الأصابع داخلياً في اتجاه راحة اليد، وهذا ما يسمى تقفع.

العلاج:

من المهم إدراك العلامات و اللجوء باكراً إلى طبيب مختص في عظام اليد إذا كنت تظن أن لديك تقفع دوبيوتران سوف يساعدك الطبيب في علاجه.

وإذا كنت مهتم بمعرفة العلاج غير الجراحي لهذه الحالة يرجى زيارة الموقع www.XIAFLEX.com

معلومات أمان مهمة عن دواء Xiaflex:

هو دواء ذو وصفة طبية يستخدم لعلاج تقفع دوبيوتران عند البالغين، من غير المعروف إذا ما كان Xiaflex آمناً لدى من أعمارهم أقل من 18 عاماً.

لا تقم باستعمال هذا الدواء في حالة وجود حساسية تجاه (**collagenase clostridium histolyticum**) أو تجاه أي مكون من مكونات Xiaflex أو تجاه أي نوع آخر من أنزيم الكولاچيناز.

الأعراض الجانبية لهذا الدواء:

يمكن أن يؤدي Xiaflex الي أعراض جانبية خطيرة تشمل:

- 1- قطع في الأوتار أو ضرر في الأربطة، وهذا قد يحتاج الي تدخل جراحي لإصلاح هذا الضرر.
- 2- إصابة عصبية أو إصابة خطيرة أخرى في اليد، وفي حالة وجود أي خَدَرٍ، إرتعاش، زيادة في الألم، أو قطع في جلد الإصبع أو اليد التي تم علاجها أو بعد المتابعة اتصل بمسئول الرعاية الصحية على الفور.
- 3- فرط حساسية لذا يمكن أن يحدث ردة فعل تحسسية شديدة للأشخاص الذين يتناولون Xiaflex لأنه يحتوي على بروتينات غريبة عن الجسم.
- أخبر المسئول الصحي الخاص بك في حالة وجود أي رد فعل تحسسي تجاه الجرعة السابقة من Xiaflex أو أي نزيف أو مشكلة طبية.
- 4- زيادة فرص النزيف حيث يمكن أن يحدث نزيف أو كدمات في مكان الحقن للأشخاص الذين يتلقون Xiaflex.
- إذا كان لديك أي مشكلات في تجلط الدم يجب عليك التواصل مع المسئول الصحي الخاص بك فوراً حيث قد يكون Xiaflex غير مناسب لك .

5- من أكثر الأعراض الجانبية انتشاراً لـ Xiaflex في علاج تقفع دوبيوتران:

- تورم مكان الحقن أو اليد.
- كدمات أو نزيف في مكان الحقن.
- ألم في مكان الحقن أو في اليد.
- تورم الغدد الليمفاوية في الكوع أو تحت الإبط.
- حكة.
- تشققات في الجلد.
- احمرار أو سخونة في الجلد.
- ألم في الإبط.

• التاريخ: 2021-09-07

• التصنيف: طب

#الطب #امراض #انحاء الاصابع #دوبيوتران



المصادر

- webmd.com

المساهمون

- ترجمة
 - [حبيبة محمد](#)
- مراجعة
 - [إياد دسوقي](#)
- تحرير
 - [متولي حمزة](#)
- تصميم
 - [احمد صلاح](#)
- نشر
 - [احمد صلاح](#)